



- English
- Español
- Encuesta Español
- Português
- Français
- Italiano
- 日本語
- Polski
- Farsi (Iran)
- Ελληνική Γλώσσα

Encuesta Día Mundial de la Deglución 2016 de la ESSD

Descripción y Objetivos

El objetivo del Día Mundial de la Deglución es establecer una campaña de concienciación con la que informar sobre la deglución normal y las alteraciones de la deglución, sus causas y complicaciones, la detección precoz y su manejo, dirigida tanto a los profesionales sanitarios como al público general. La Sociedad Europea para las Alteraciones de la Deglución, ESSD, participa en el Día Mundial de la Deglución llevando a cabo una encuesta corta con la que recoger datos sobre a cuántos pacientes se les detecta/evalúa la disfagia orofaríngea durante la semana del Día Mundial de Deglución (este año los días 12-16 de Diciembre de 2016), qué herramienta de detección/ evaluación se ha usado, a qué tipo de pacientes se criba para detección y cómo se informa de la disfagia orofaríngea. Además de recoger esta información, la ESSD promociona el uso de los códigos ICD de la disfagia en los informes médicos para mejorar la visibilidad de esta condición.

El Día Mundial de la Deglución fue promovido por primera vez el 12 de Diciembre de 2011 por el Profesor Mohamed Farahat (MD, PhD) del departamento de investigación sobre las alteraciones de la voz, deglución y comunicación (RCVASD), del King Saud Univesity, Riyadh, Arabia Saudí. La Unión de Foniatras Europeos (UEP) se unió al DMD en 2013 que se celebró con actividades en Arabia Saudí, Kuwait, Dubai y Alemania.

Al mismo tiempo, la ESSD también inició el proceso de creación del Día de la Disfagia en 2011, con una encuesta piloto sobre la detección y evaluación de la disfagia orofaríngea. Se mantuvieron conversaciones con asociaciones de disfagia de Canadá, Brasil y Japón con la intención de crear un movimiento global reconocido por la OMS.

Estas dos iniciativas con objetivo común se unieron bajo el estandarte del Día Mundial de la Deglución el 2014.



Por favor, rellene con sus datos de contacto y con la información sobre los pacientes a los que se ha detectado/evaluado disfagia orofaríngea entre los días 12-16 de Diciembre

Q1 Profesional sanitario. Rellene con sus datos personales

Nombre	<input type="text"/>
Ámbito profesional	<input type="text"/>
Hospital/Clínica/ Consulta	<input type="text"/>
Ciudad	<input type="text"/>
País	<input type="text"/>
Dirección de correo electrónico	<input type="text"/>
Teléfono	<input type="text"/>

Q2 En qué tipo de centro trabaja?

- Hospital de cuidados agudos
- Centro de rehabilitación
- Atención primaria
- Cuidados paliativos
- Centro geriátrico/Residencia de ancianos
- Consulta
- Otros

Por favor especifique

Detección/Evaluación de la disfagia en pacientes entre el 12-16 de Diciembre

Q3 ¿A cuántos pacientes les detectó/evaluó la disfagia orofaríngea entre el 12-16 de Diciembre?

¿Cuántos de ellos dieron positivo para disfagia orofaríngea?

¿En cuántos de sus informes médicos incluyó el diagnóstico de disfagia orofaríngea?

¿En cuántos informes médicos incluyó el código ICD para disfagia (ICD 10: R13, ICD 9: 787.20)?

Q4 Indique el número de cada tipo de pacient evaluado por disfagia

Ancianos

Pacientes con enfermedad neurodegenerativa

Pacientes con enfermedad de cabeza y cuello

Pacientes de ictus

Otros

Q5 Indique el número de pacientes evaluados en función de la unidad de la que fueron derivados

Urgencias

ORL

Unidad de geriatría

Cuidados intensivos

Medicina Interna

Neurología

Unidad de ictus

Oncología

Psiquiatría

Radiología

Atención primaria

Centro geriátrico/Residencia de ancianos

Otros

Q6 ¿Cribó a sus pacientes para la detección de disfagia? En caso afirmativo, ¿qué método utilizó?

- EAT-10
- Sydney Swallowing Questionnaire (SSQ)
- Mann Assessment of Swallowing Ability (MASA)
- Toronto Bedside Swallowing Screening Test (TOR-BSST)
- Test del agua
- Método Exploración Clínica Volumen-Viscosidad (MECV-V)
- Otros

Por favor especifique

Q7 ¿Derivó a sus pacientes para evaluación instrumental? En caso afirmativo, ¿qué método se utilizó?

- VFS
- FEES
- Manometría
- Otros

Por favor especifique

Q8 Es usted miembro de alguna asociación de disfagia?

- Adult Dysphagia Special Interest Group, Ireland
- ASHA American Speech-Language-Hearing Association
- AAD Asociación Argentina de Disfagia
- BSSD Belgian Society for Swallowing Disorders
- DGD German Society for Dysphagia
- DRS Dysphagia Research Society, US
- ESSD European Society for Swallowing Disorders
- Finnish Dysphagia Society
- GISD Gruppo Italiano Studio Disfagia
- JSDR Japanese Society for Dysphagia and Rehabilitation
- Korean Dysphagia Society
- NFOSD National Foundation of Swallowing Disorders, US
- SGD Schweizerische Gesellschaft für Dyshagie, Switzerland
- TDRS Turkish Dysphagia Research Society
- UKSRG UK Swallowing Research Group
- No
- Otro

Por favor especifique

Educación i formación en disfagia

Q9 ¿El manejo de la disfagia estaba incluido en el currículo profesional de su enseñanza académica (universidad) ?

- Sí, a fondo
- Sí, pero superficialmente
- No, en absoluto

Comentarios

Q10 ¿Ha realizado actividades educativas acreditadas específicas sobre el manejo de la disfagia? En caso afirmativo, ¿cuáles?

- Sí
- No

Comentarios

Q11 ¿Sigue guías clínicas acreditadas sobre el manejo de la disfagia? En caso afirmativo, ¿cuáles?

Sí

No

Comentarios

Q12 ¿Ha asistido a conferencias/reuniones sobre disfagia? En caso afirmativo, ¿cuáles?

Sí

No

Comentarios